

FINALIDAD

Esta prueba se solicita para detectar la presencia de antígeno de dos de los virus que más frecuentemente producen diarrea y síntomas digestivos en niños y adultos jóvenes.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

De forma general no precisa ninguna preparación, salvo que el médico que prescriba la prueba indique lo contrario.

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA

- Necesitará un frasco de cierre hermético para recogida de heces, de venta en farmacias.
- La deposición debe realizarse sobre un recipiente de boca ancha tipo orinal o cuña. No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio y bien aclarado (no deberá contener restos de jabones, detergentes ni desinfectantes).
- Transfiera, cuidadosamente una cantidad de heces equivalente al tamaño de 2 nueces, si la deposición es sólida; si la deposición es líquida no llene más de la mitad del bote de recogida.
- Evite la contaminación con orina, papel higiénico, agua, etc.
- Procure llevar la muestra al laboratorio lo antes posible, mientras tanto, puede conservar la muestra a temperatura ambiente.

TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO

2 días

Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email atencionalpaciente@analizalab.com o en el teléfono 902 67 64 57 o 914 297 541